



Sveučilište u Rijeci • Medicinski fakultet
Braće Branchetta 20/1 • 51000 Rijeka • CROATIA
Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
tel: +385 (0)51 651 131
fax: +385 (0)51 678 896
e-mail: medgen.medri@uniri.hr

CITOGENETIČKA ANALIZA STANICA POBAČENOG PLODA

Citogenetička analiza stanica pobačenog ploda omogućava određivanje kariotipa. Uzorak za analizu dobiva se evakuacijom ploda nakon što je ultrazvukom utvrđena fetalna smrt. Kariotip se može odrediti ili u stanicama kože ploda ili pak u stanicama embrionalne ovojnice (trofoblast). Citogenetička analiza stanica pobačenog ploda omogućava bolje genetičko savjetovanje i praćenje naredne trudnoće.

VALJA NAGLASITI DA 15% KLINIČKI DOKAZANIH TRUDNOĆA ZAVRŠAVA KAO SPONTANI POBAČAJ TE DA JE 50% - 60% UZROKOVANO NEKOM OD KROMOSOMSKIH ABERACIJA. NAJČEŠĆE SE RADI O NUMERIČKIM ABERACIJAMA KAO ŠTO SU TRISOMIJE, TRIPLOIDIJE TE MONOSOMIJA X-KROMOSOMA.

UZORAK POTREBAN ZA ANALIZU: tkivo pobačenog ploda

PRIJEM PACIJENATA: SVAKIM RADNIM DANOM
(uzorkovanje se izvodi u KBC Rijeka, Klinika za ginekologiju i porodništvo)

TRAJANJE ANALIZE: 2 - 3 TJEDNA